

päivitetty 25.10.2018

Utaretulehdusten hoito lypsykaudella

Jos lehmällä on yleisoireita (kuume, syömättömyys), ota yhteys eläinlääkäriin

Jos maidossa on soluja (yli 200 000), ota jokaisesta oireilevasta neljänneksestä maitonäyte viljelyyn

(Str. agalactian havaitsemiseksi voi käyttää lehmän yhteisnäytettä). Hoito viljelyn perusteella:

STR. AGALACTIA

- uusi saneeraussuunnitelma: hyvät lehmät hoidetaan, hoito lypsykaudella Mamyzin 1 pullo kerran päivässä 1 pv, samanaikaisesti aloitetaan Carepen 3 pv jokaiseen utareneljännekseen. Uusivat ja huonot lehmät karsitaan. Eristys ja erillislypsy kannukoneella hoidettaville kunnes puhtaita.

S . AUREUS B- laktamas –

- ensisijainen hoito lehmän poisto/ neljänneksen umpeutus, jos hoidetaan Penovet + Carepen 5 pv.

S. AUREUS B- laktamas +, KNS (Staphylococcus spp) B- laktamas +

- ensisijaisesti lehmän poisto / neljänneksen umpeutus, jos hoidetaan, yhteys eläinlääkäriin

KNS B- laktamas - (STAPHYLOCOCCUS SPP)

- jos ainoastaan lievää solutusta, menee ohi itsestään
- jos hoidetaan, Carepen 3 – 4 pv kerran päivässä (pahemmissa voi laittaa aamuin illoin).

STREPTOCOCCUS UBERIS

- Penovet 5 pv ja Carepen 3 pv kerran päivässä. Vaihtoehtoisesti (lyhyempi varoaika) Penovet 2 pv ja Mamyzin 3pv 1 pullo kerran päivässä, Carepen 3 pv.

STREPTOCOCCUS DYSGALACTIA

- voi mennä lypsämällä ohi, hoito Carepen 3 pv kerran päivässä (pahemmissa voi laittaa aamuin illoin).

C. BOVIS

- ei antibioottihoitoa, menee ohi yleensä itsestään

MYKOPLASMA BOVIS

- ota välittömästi yhteys eläinlääkäriin!

E. COLI

- jos ei yleisoireita, ei antibioottia, menee usein ohi itsestään, tiheä lypsy, tarvittaessa tulehduskipulääke (Dinalgen), maidon irrotukseen 1 ml Vetox lihakseen
- jos yleisoireita, yhteys eläinlääkäriin (samoin KLEBSIELLA)

T . PYOGENES

- Penovet (+ Carepen) 5 p

HIIVA, ENTEROCOCCUS SPP

- ei antibioottihoitoa, tiheä lypsy, tarvittaessa Dinalgen (tulehduskipulääke)

Muut: ota yhteys eläinlääkäriin!

Muut hoidettavat sairaudet

Sorkkavaivat

- tilalla on esiintynyt aiemmin tarttuvaa sorkkavälitulehdusta, nyt epäily DD ?
- oireet: vaihteleva ontuminen ilman muita näkyviä oireita, ei yleisoireita
- hoito: sorkkahoito, ensiavuksi Dinalgen tai Ketovet. Tarvittaessa Geepenil 20 ml aamuin illoin 4 – 5 pv.
- jos lehmä ei varaa painoa jalalle ollenkaan tai hyvin heikosti, ota yhteys eläinlääkäriin

Niveltulehdukset

- oireet: yhden tai useamman nivelen turvotus, ontuminen, mahdollisesti lievä lämpö
- hoito: ensiavuksi Dinalgen, jos ei auta yhteys eläinlääkäriin

Vasikoiden tulehdukset

- vasikoilla joskus paiseita (ryhmäkarsinoissa lukkoparret, jotkut vasikat yrittävät riuhtoa itsensä irti)
- joskus niveltulehduksia loukkaantumisen seurauksena
- yskää (RS- virus) esiintyy jonkin verran (varsinkin ripulin sairastaneilla vasikoilla)
- hoito: Alamycin LA 1 ml / 10 kg joka toinen päivä 2 – 3 kertaa.