

Päivitetty viimeksi: 16.08.2017

Riitta Syrjä ELL 879

- a) eläinten pitopaikka
Aholan Maito
FI 000002462382
Otermantie 7 91600 Utajärvi
- b) Valtakunnallisen terveydenhuolto-ohjelman mukainen eläinlajikohtainen selvitys tautisuojuuksesta sekä eläinten pitopaikan toimintatavoista ja pito-olosuhteista, joilla on merkitystä eläinten lääkitystarpeen kannalta

Pitopaikka on kahden lypsyrobotin pihatto, jossa on noin 120 lypsyssä olevaa lehmää, yhteensä n 260 nautaa. Tila on luomutila. Hiehot ja vasikat ovat vanhassa navetassa. Umpilehmillä on oma osastonsa uudessa navetassa, josta ne pääsevät ulos jaloittelemaan. Kaikki ikäluokat ovat omilla osastoissaan. Lehmät poikivat olkipohjaiselle poikima-alueelle, muuten kuivikkeena käytetään turvetta. Parsissa on parsipedit. Ritiäkäytävien puhdistuksen hoitaa robotti, parret puhdistetaan käsipelillä useamman kerran päivässä. Lehmät ovat puhtaita. Kesällä ne pääsevät ulos laitumelle, lehmät pääsevät ulos jaloittelemaan myös talvella. Samoin osa hiehoista laidunaa. Vastasyntyneille vasikoille on yksilökarsinat, josta ne pian siirretään vanhaan navettaan ryhmäkarsinoihin. Kesällä pikkuvasikat ovat ulkona igluissa, jotta tartuntapaine vanhassa navetassa saadaan pienemmäksi. Isommilla vasikoilla on jo pehmustetut parret.

Tautisulku on molemmissa navetoissa. Omat vaatteet vaihdetaan talon suojavaatteisiin ja saappaisiin. Vesipisteitä on riittävästi ympäri navettaa.

Eläimiä on jouduttu ostamaan useammasta paikasta, kaikilla ostoeläimillä ei ole ollut terveystodistusta, salmonella- todistukset kylläkin.

- c) Eläinten terveydentilan ylläpitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvät toimenpiteet, kuten rokotus- ja loishäätöohjelma sekä vitamiinien ja hivenaineiden saannin turvaaminen.

Tilalla on todettu Streptococcus agalactia tartunta, joka aiheuttaa monenlaista lisätyötä. Maitonäytteitä otetaan runsaasti, robotin puhdistusta on lisätty, vesikupit puhdistetaan päivittäin. Virkonilla ja yleiseen hygieniaan on kiinnitetty huomiota. Umpituubit laitetaan kaikille lehmille maitonäytteen mukaisesti toistaiseksi, kunnes agalactia saadaan rauhoittumaan.

Tilan vasikoista on eristetty rota- virus. Vanhemmista vasikoista on eristetty kokkideja. Pahoja epidemioita ei ole esiintynyt, paranevat yleensä Benfital- juotolla. Vasikkakarsinat desinfioidaan Neopredisan- liuoksella tyhjennyksen jälkeen kokkidipaineen vähentämiseksi. Ternimaidon juottoa on tehostettu, ja vasikoiden iglukasvatus kesällä vähentää huomattavasti tautipainetta.

Luomutilalla ennaltaehkäisevä hoito ei ole sallittua, mutta koska poikimahalvausriski on suuri ja halvaantuneen lehmän hoitaminen jalattomana on monesti jo myöhäistä, olen määrännyt tilan

riskilehmille (kolme kertaa poikineet ja vanhemmat, jos alilämpöisiä tai horjuva) kalsiumboluksia. 1 tai kaksi bolusta riittää yleensä, ja omistaja merkitsee hoidot kirjanpitoon.

Orgaanista seleeniä sisältävä seleenikivennäinen on erittäin tärkeä luomutuotannossa. Kivennäiset ja vitamiinit lisätään appeeseen.

d) vasikoiden nupoutus

Vasikat nupoutetaan eläinlääkärin suorittamassa nukutuksessa, puudutettuna ja tulehduskipulääkkeen kera.

- e) Eläinten pitopaikassa tavanomaisesti ilmenevät lääkkeiden käyttötarvetta aiheuttavat sairaudet Yleisin lääkkeiden käyttöä aiheuttava sairaus on utaretulehdus. Tilalta on löydetty yksittäisiä Streptococcus agalactia- tapauksia, mikä merkitsee runsasta näytteenottoa. Tilalla on käyty tekemässä tilannekatsaus Pro Agrian toimesta, ja tilalle on tehty Str. agalactiae - saneeraussuunnitelma. S agalactia- hoito on aloitettava välittömästi, mikäli hoidetaan, ensisijaisesti sairastuneet lehmät karsitaan pois. Kaikille lehmille on sovittu käytettävän umpeenpanotuubeja, kunnes S agalactia saadaan hävitettyä. Muita tilalla esiintyviä bakteereja ovat KNS, S. uberis ja S. dysgalactia sekä muutamia S aureus- tapauksia. Penisilliiniresistenttejä kantoja on joitakin.

Tilalla on satunnaisesti nivel- ja sorkkatulehduksia, jotka voivat vaatia antibioottikuurin. Ennen lääkityksen aloittamista yhteys eläinlääkäriin.

Vasikoilla esiintyy jonkin verran paiseita, niveltulehduksia ja yskää, jotka voivat vaatia antibioottikuurin.

Ripuloivilta vasikoilta on löydetty Eviran tutkimuksissa kokkideja, minkä takia vasikkakarsinoiden puhdistusta ja desinfiointia on tehostettu. Käytössä on kokkideihin tehoava desinfiointiaine Neopredisan. Tarvittaessa lääkitään sulfalla. (Tribriksen vet)

- f) Ohjeet terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin toteamien tavanomaisesti ilmenevien sairauksien tai yksittäisten pito-olosuhteisiin liittyvien sairastapauksien hoidosta. Ohjeista on käytävä ilmi, millaisten oireiden ilmetessä hoitaja saa ryhtyä lääkityksiin, lääkevalmiste, lääkkeen annos ja lääkekuurin pituus, eläinten tuotantovaihe ja ikäryhmä sekä lääkkeelle määrätty varoaika.

Tavoitteena on, että suurin osa utaretulehduksista lääkittäisiin umpeenpanon yhteydessä, mutta aina ei ole mahdollista odottaa niin kauan, S agalactia on hoidettava heti jollei lehmää poisteta. Lisäksi lypsykauden ajan utaretulehduksia lääkitään tarvittaessa erillisten suunnitelmien mukaan (katso liitteet)

Tilalle jätettyjen lääkkeiden käyttöohjeet:

Penovet vet 300 mg injektioneste, suspensio

- Käyttö lehmille 40 ml (max 600 kg lehmä), yli 600 kg painaville 50 ml lihakseen kerran päivässä 5 pvn ajan liitteessä mainittuihin käyttötarkoituksiin
- varoaika teurastus 14 vrk, maito 6 vrk. Luomussa varoajat kaksinkertaiset, omistaja merkitsee
- säilytys: jääkaapissa (2 – 8 C). Avattu pakkaus käytettävä 7 pvn kuluessa.

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle

- käyttö: 1 tuubi tulehtuneeseen utareneljännekseen 1 - 2 kertaa päivässä 3 – 5 pvn ajan utaretulehdukseen (koska luomu- varoajat, voi käyttää aamuin illoin, yleensä kerran vuorokaudessa riittää)
- varoaika: teurastus 3 vrk, maito 6 vrk, luomussa kaksinkertaiset
- säilytys: alle 25 C

Dinalgen vet 150 mg/kg injektioneste, liuos naudalle

- tulehduskipulääke
- käyttö: 1 ml / 50 kg lihakseen kerran päivässä 1 – 3 päivän ajan
- utaretulehdusten ja jalkavaivojen tukihoitona
- ota yhteys eläinlääkäriin, jos eläimellä epäillään olevan maha- suolikanavan ongelmia
- varoaika: teurastus 2 vrk, maito 0 tuntia (liha luomussa 4 vrk)
- säilytys: ei erityisiä säilytysohjeita. Avattu pakkaus käytettävä 28 vrk kuluessa

Umpimycin vet intramammaarisuspensio

- umpeenpanovalmiste
- käyttö: 1 tuubi jokaiseen utareneljännekseen umpeenpanon yhteydessä viimeisen lypsyn jälkeen
- liitteissä mainittuihin käyttötarkoituksiin, agalactiae- saneerauksen ajan kaikille lehmille
- varoaika: teurastus 9 vrk, maito 37 vrk annostelusta / 36 tuntia poikimisesta (huom luomu!)
- säilytys alle 25 C

Orbenin retard vet 500 mg intramammaarisuspensio

- umpeenpanovalmiste, penisilliinille resistentteihin bakteeritulehduksiin
- käyttö: 1 tuubi jokaiseen utareneljännekseen umpeenpanon yhteydessä viimeisen lypsyn jälkeen liitteessä mainittuihin käyttötarkoituksiin
- varoaika: teurastus 1 vrk, maito 47 vrk annostelusta, 5 vrk poikimisesta (huom luomu!)

Alamycin LA vet 200 mg/ml injektioneste naudoille, 100 ml

- laajakirjoinen pitkävaikutteinen antibiootti
- sopii vasikoiden paiseiden, niveltulehdusten ja hengitystietulehdusten hoitoon (Eviran ohjeistus)
- käyttö: 1 ml / 10 kg joka toinen päivä 1 – 3 kertaa.
- varoaika: teurastus 21 vrk, maito 7 vrk

- säilytettävä valolta suojattuna alle 25 C, avattu pullo käytettävä 28 vrk kuluessa

Tribriksen vet injektioneste

- laajakirjoinen sulfavalmiste kokkidiripuliin, suun kautta annettavaa ennaltaehkäisyyn käytettävää valmistetta ei voi luomussa käyttää
- käyttö: 1,5 ml / 30 kg kerran päivässä nahan alle 3. pvnä.
- varoaika: teurastus 34 vrk.
- säilytettävä huoneenlämmössä valolta suojattuna, ei saa jäättyä. Avattu pullo käytettävä 4 viikon kuluessa.

Orbeseal / Noroseal

- antibiootiton umpeenpanovalmiste suojaamaan umpeenpano- ja poikimisvaihetta umpeenpanovalmisteen lisänä tai pelkästään
- käytetään umpeenpantaessa viimeisen lypsyn ja umpeenpanotuubin jälkeen
- ei varoaikoja
- säilytetään huoneenlämmössä

g) Eläinten pitopaikkakohtaiset tavoitteet lääkkeiden käytölle

Tilalla pyritään pitämään varastossa alla olevat määrät lääkkeitä, ja tavoitteena on, että nämä lääkkeet riittäisivät 2 kk jakson ajaksi:

Penovet	8 x 250 ml
Carepen	3 x 5 tuubia, 16 yksittäispakattua tuubia
Dinalgen	-
Umpimycin	35 annosta
Orbenin retard	4 annosta
Alamycin LA	-
Ketovet jauhe	-
Tribriksen vet	-
Noroseal	-

Luomutila, lääkkeitä pyritään käyttämään mahdollisimman vähän.